







2002



2013/2014



Verspreiding van Lavendelhei (*Andromeda polifolia*) in het Fochteloërveen

-  zeldzaam (r, s)
-  occasional - lokaal frequent (o, lf)
-  frequent - lokaal abundant (f, la)
-  abundant - dominant (a, ld, d)
-  waarneming op puntlocatie
-  soort niet aangetroffen



1:45.000

0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_010a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Verspreiding van Kleine zonnedauw (*Drosera intermedia*) in het Fochteloërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |




1:45.000

0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_008a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Verspreiding van Ronde zonnedaauw (*Drosera rotundifolia*) in het Fochteloërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |



1:45.000


0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_012a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Verspreiding van Kraaihei (*Empetrum nigrum*) in het Fochteloërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |




1:45.000


0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_009a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002




2013/2014



Verspreiding van Eenrig wollegras (*Eriophorum vaginatum*) in het Fochteloërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |



A&W-rapport 2089
teknr. 2189_004a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002




2013/2014



Verspreiding van Moeraswolfsklauw (*Lycopodiella inundatum*) in het Fochtelooërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |



A&W-rapport 2089
teknr. 2189_011a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Verspreiding van Wilde gagel (*Myrica gale*) in het Fochteloërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | • | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |




1:45.000


0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_014a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Verspreiding van Grote veenbes (*Oxycoccus macrocarpos*) in het Fochteloërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |



1:45.000

0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_006a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Verspreiding van Kleine veenbes (*Oxycoccus palustris*) in het Fochteloërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |



1:45.000

0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_007a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Verspreiding van Witte snavelbies (*Rhynchospora alba*) in het Fochteloërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |



1:45.000

0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_015a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002




2013/2014



**Verspreiding van Gewone veenbies (*Trichophorum cespitosum subsp. germanicum*)
in het Fochteloërveen**

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |




A&W-rapport 2089
teknr. 2189_005a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Verspreiding van Trosbosbes (*Vaccinium corymbosum*) in het Fochteloërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |



1:45.000

0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_013a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002




2013/2014



Verspreiding van overige zeldzame soorten in het Fochteloërveen

- | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ★ Beenbreek (<i>Narthecium ossifragum</i>) | ● Jeneverbes (<i>Juniperus communis</i>) |
| ■ Brede orchis (<i>Dactylorhiza majalis subsp. majalis</i>) | ■ Klokgesgentiaan (<i>Gentiana pneumonanthe</i>) |
| ■ Bruine snavelbies (<i>Rhynchospora fusca</i>) | ◆ Liggende vleugeltjesbloem (<i>Polygala serpyllifolia</i>) |
| ★ Grondster (<i>Illecebrum verticillatum</i>) | ▲ Valkruid (<i>Arnica montana</i>) |
| ■ Grote wolfsklauw (<i>Lycopodium clavatum</i>) | |



A&W-rapport 2089
teknr. 2189_023a/23022015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Verspreiding van Stijf veenmos (*Sphagnum capillifolium*) in het Fochteloërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |




1:45.000

0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_016a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



**Verspreiding van Hoogveen-veenmos (*Sphagnum magellanicum*)
in het Fochteloërveen**

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |



1:45.000


0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_017a/09032015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Verspreiding van Wrattig veenmos (*Sphagnum papillosum*) in het Fochteloërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |




1:45.000

0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_018a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Verspreiding van Rood veenmos (*Sphagnum rubellum*) in het Fochteloërveen

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | | zeldzaam (r, s) | | waarneming op puntlocatie |
| | | occasional - lokaal frequent (o, lf) | | soort niet aangetroffen |
| | | frequent - lokaal abundant (f, la) | | |
| | | abundant - dominant (a, ld, d) | | |



1:45.000


0 0,5 1km

A&W-rapport 2089
teknr. 2189_019a/18022015/sa
topografie: Kadaster

2002




2013/2014



Verspreiding van zeldzame veenmossen in het Fochteloërveen

- Bruin veenmos (*Sphagnum fuscum*)
- Geoord veenmos (*Sphagnum denticulatum*)
- ◆ Kam-veenmos (*Sphagnum affine*)
- ♣ Slank veenmos (*Sphagnum flexuosum*)
- ▲ Smalbladig veenmos (*Sphagnum angustifolium*)
- ♣ Uitgebeten veenmos (*Sphagnum riparium*)
- Violet veenmos (*Sphagnum russowii*) + ♣ in 2002



A&W-rapport 2089
teknr. 2189_020a/09032015/sa
topografie: Kadaster

2002



2013/2014



Verspreiding van zeldzame mossen in het Fochteloërveen

Kussentjesmos (Leucobryum glaucum)

- zeldzaam (r, s)
- occasional - lokaal frequent (o, lf)
- frequent - lokaal abundant (f, la)


Gerimpeld gaffeltandmos (Dicranum polysetum)

- zeldzaam (r, s)
- abundant - dominant (a, ld, d)



1:45.000

0 0,5 1km





A&W-rapport 2089
teknr. 2189_022a/09032015/sa
topografie: Kadaster

2002

niet gekarteerd in 2002

2013/2014

Verspreiding van korstmossen in het Fochteloërveen

-  Open rendiermos (*Cladina portentosa*)
-  Rode heidelucifer (*Cladonia floerkeana*)



1:45.000

0 0,5 1 km



A&W-rapport 2089
teknr. 2189_021a/09032015/sa
topografie: Kadaster